

ENPreCoSP

Encuesta Nacional sobre
Prevalencias de Consumo de
Sustancias Psicoactivas 2008

DOCUMENTO PARA LA
UTILIZACIÓN DE LA
BASE DE DATOS USUARIO

Índice

Presentación	3
Objetivo de la ENPreCoSP-2008	4
Relevamiento.....	5
Instrumentos de captación y metodología de aplicación.....	5
Procesamiento de la información	5
Recomendaciones técnicas para la utilización de la Base de Datos Usuario	6
Tipos de variables presentadas.....	8
Otras consideraciones técnicas	8
DICCIONARIO DE REGISTRO DE LA BASE DE DATOS USUARIO	9
ANEXO 1: Aspectos metodológicos	48
ANEXO 2: Aspectos conceptuales	54
ANEXO 3: Cuestionario	60
ANEXO 4: Tarjetas del cuestionario	80

Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 (ENPreCoSP-2008), mediante un convenio suscripto conjuntamente con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a través del Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja y el Ministerio de Salud, con la participación de las Direcciones de Estadística en cada una de las 24 jurisdicciones del país (24 DE).

Este documento tiene por finalidad ofrecer a los usuarios de la ENPreCoSP-2008 una guía para la utilización de la Base de Datos Usuario.

La Base de Datos Usuario cumple con lo estipulado en la Ley N° 17.622 de Resguardo del Secreto Estadístico garantizando que la información que se presenta mantenga el carácter confidencial y reservado del informante.

Para consultas: Centro Estadístico de Servicios (CES)

Av. Julio A. Roca, 609, PB C1067ABB Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Horario de atención: de 9.30 a 16.30

Teléfono: 4349-9652/9646

Fax: 4349-9646

Correo electrónico: ces@indec.mecon.gov.ar / enprecosp-2008@indec.mecon.gov.ar

Objetivo de la ENPreCoSP-2008

El objetivo general de esta Encuesta fue contribuir a actualizar el sistema de información sobre el consumo de sustancias psicoactivas a nivel nacional y, de esa manera, al diseño de políticas públicas más eficaces, orientadas a mejorar las condiciones de salud de la población.

Sus objetivos específicos fueron:

- estimar la cantidad de personas que declararon haber consumido sustancias psicoactivas en diferentes períodos de referencia (prevalencias) y su incidencia en relación con la población total. Se entiende por sustancias psicoactivas a las drogas legales o sociales (tabaco, bebidas alcohólicas), ilegales (marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, opiáceos y anestésicos, crack, alucinógenos, inhalables y otras drogas) y fármacos (estimulantes, tranquilizantes, anorexígenos);
- determinar las características sociodemográficas, socioeconómicas, educativas y del entorno familiar social de la población de 16 a 65 años de edad que consume sustancias psicoactivas.

Relevamiento

El relevamiento fue ejecutado en función de lo establecido por la Ley N° 17.622 de centralización normativa y descentralización operativa en el marco del Sistema Estadístico Nacional. Se desarrolló entre los meses de mayo y junio de 2008.

Instrumentos de captación y metodología de aplicación

En los hogares que habitan las viviendas seleccionadas se aplicó un cuestionario formado por dos bloques:

- Un **Bloque del Hogar**: destinado a relevar datos sobre condiciones habitacionales, aspectos sociodemográficos, educativos y económicos de todas las personas que conforman el hogar.
- Un **Bloque Individual**: destinado a relevar datos sobre la situación laboral y de salud general, así como aspectos sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Este bloque se aplicó a un único componente seleccionado al azar entre los integrantes del hogar que tenían entre 16 y 65 años.

La selección del encuestado se hizo aleatoriamente aplicando la tabla de selección de Kish. Dicha tabla se encuentra en el capítulo 6 del Bloque del Hogar.

En el caso de la persona seleccionada, la entrevista fue personal, es decir, debía contestar por sí misma (autoinformante).

Procesamiento de la información

El sistema de ingreso y consistencia de los datos de la Encuesta fue desarrollado en Visual Basic sobre una base de datos Oracle, con consistencia en línea y una interfaz web realizada en PHP y JavaScript que permitió actualizar la información ingresada en tiempo real.

- El sistema permitió, también, ejecutar los controles de validación muestral y consistencia de datos.

Recomendaciones técnicas para la utilización de la Base de Datos Usuario

Al trabajar la información recuerde que los datos son referidos a la población objetivo: población de 16 a 65 años.

En el caso de las variables de Vivienda, Hogar y Jefes del Hogar, recuerde que sólo puede hacer inferencia sobre su relación con la población objetivo y no con el conjunto de las viviendas, hogares o Jefes/as del Hogar.

Se detalla a continuación el listado de información presentada:

- **Datos generales**

- Identificación de los registros

- Factor de Expansión

- **Dominios de estimación geográfica**

- Región Estadística

- Agrupamiento de poblaciones urbanas

- Jurisdicción del país

- Aglomerado urbano de 500.000 y más habitantes

- **Características de la vivienda donde reside la persona seleccionada**

- Tipo de vivienda

- Cantidad de habitaciones

- Material predominante de los pisos

- Material predominante de la cubierta exterior del techo

- Tenencia de cielorraso/revestimiento interior

- Combustible usado para cocinar

- Tenencia de agua

- Forma de obtención del agua

- Tenencia de baño

- Características del baño

- **Características del hogar al que pertenece la persona seleccionada**

- Tamaño del hogar

- Tipo de hogar

- Ingreso total mensual del hogar

- Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas del hogar

- **Características del Jefe del Hogar**

- Sexo

- Edad

- Situación conyugal

- Nivel de instrucción

- Cobertura de salud

- Situación laboral

- **Características de la persona seleccionada**

- Relación de parentesco del seleccionado con el Jefe

- Sexo

- Edad

- Situación conyugal

- Nivel de instrucción

- Cobertura de salud

- Situación laboral

- **Autopercepción de salud y entorno de la persona seleccionada**

- Salud general

- Acceso y entorno

- **Consumo de sustancias psicoactivas de la persona seleccionada**

- Tabaco

- Bebidas alcohólicas

- Tranquilizantes

- Estimulantes

- Marihuana

- Cocaína

- Pasta base

- Éxtasis

- Inhalables

- Otras drogas

- **Impacto del consumo en las actividades habituales de la persona seleccionada**

- Bebidas alcohólicas

- Drogas y bebidas alcohólicas

- **Demanda de Tratamiento de la persona seleccionada**

Tipos de variables presentadas

En la base se han utilizado dos tipos de variables, que se presentan más adelante en el “Diccionario de Registro”.

Estos tipos de variables son:

- aquellas cuyo campo se identifica con el nombre de la pregunta del cuestionario;
- aquellas cuyo campo se identifica con un nombre especial, ya que fue construida a través de una secuencia de preguntas.

Los nombres del primer tipo de variables están formados por dos letras del bloque (Hogar **BH**, Individual **BI**), dos del capítulo y el número de pregunta referida. Ejemplo: BISG01 es la primera pregunta del capítulo Salud General del Bloque Individual.

La denominación de las variables construidas hace referencia al nombre de las mismas. Ejemplo, P1M_TA se refiere a “prevalencia del último mes de consumo de tabaco”.

Las variables que se refieren al Jefe del Hogar tienen la letra jota (J) al final del nombre.

Otras consideraciones técnicas

Para el uso de la Base Usuario, se sugiere la consulta del cuestionario (lo encontrará al final de este documento).

Se advierte que en caso de **campos en blanco**, en general, los mismos se corresponden con saltos en la secuencia de preguntas.

Los datos demográficos, de nivel de instrucción, de cobertura de salud y laborales se presentan tanto para el seleccionado como para el Jefe del Hogar. En caso de que el seleccionado fuera también el jefe de su hogar, los datos se encuentran en ambos campos.

Los códigos **9**, **99** y **999**, que en general son el valor máximo de cada escala, se corresponden con datos que el encuestado no sabía o no quería contestar.

El código cero (**0**) es un valor válido sólo para las siguientes variables:

- nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
- último grado/año aprobado (BHCH11)
- cantidad de ambientes/habitaciones del hogar (BHCV03, BHCV04)
- rango de ingreso total mensual del hogar (RANGOING);
- cantidad de días que el encuestado tomó bebidas alcohólicas en los últimos 30 días (BIBA07_01, BIBA07_02, BIBA07_03)
- cantidad de días que ha faltado o suspendido sus actividades habituales (BIBA10, BIBA11, BIIM01, BIIM02)

DICCIONARIO DE REGISTRO DE LA BASE DE DATOS USUARIO

DATOS GENERALES

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFI	Identificación de los registros
W_PERS	Factor de expansión

DOMINIOS DE ESTIMACIÓN GEOGRÁFICA

REGION

Región estadística

- 1 Gran Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Bs. As. y 24 Partidos del GBA)
- 2 Pampeana (Resto de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos)
- 3 Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán)
- 4 Noreste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones)
- 5 Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis)
- 6 Patagónica (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego)

POB_URB

Agrupamiento de poblaciones urbanas

- 1 Más de 1.500.000 habitantes
- 2 De 500.001 a 1.500.000 habitantes
- 3 De 100.001 a 500.000 habitantes
- 4 De 5.000 a 100.000 habitantes

PROV

Jurisdicción del país

- 02 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- 06 Buenos Aires
- 10 Catamarca
- 14 Córdoba
- 18 Corrientes
- 22 Chaco
- 26 Chubut
- 30 Entre Ríos
- 34 Formosa
- 38 Jujuy
- 42 La Pampa
- 46 La Rioja
- 50 Mendoza
- 54 Misiones
- 58 Neuquén
- 62 Río Negro
- 66 Salta

70 San Juan
74 San Luis
78 Santa Cruz
82 Santa Fe
86 Santiago del Estero
94 Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur
90 Tucumán

AGL_URB

Aglomerado urbano de 500.000 y más habitantes

1 Gran Buenos Aires
2 Gran Córdoba
3 Gran Rosario
4 Gran Mendoza
5 Gran Tucumán – Tafí Viejo
6 Gran La Plata
7 Mar del Plata – Batán
8 Resto de los aglomerados

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA DONDE RESIDE LA PERSONA SELECCIONADA

VIVIENDA

BHCV01

Tipo de vivienda

1 Casa
2 Casilla
3 Departamento
4 Pieza de inquilinato
5 Pieza en hotel o pensión
6 Local no construido para habitación
7 Otros

BHCV02

¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene la vivienda en total?

(excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garage)
(Cantidad en cifras)

BHCV03

¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene este hogar para su uso exclusivo?

(excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garage)
(Cantidad en cifras)

BHCV04

De esos ¿cuántos usan habitualmente para dormir?

(Cantidad en cifras)

BHCV12	<p>¿El baño tiene...</p> <p>1 ...inodoro con botón/mochila/cadena y arrastre de agua?</p> <p>2 ...inodoro sin botón/cadena y con arrastre de agua? (a balde)</p> <p>3...letrina? (sin arrastre de agua)</p>
CHCV13	<p>¿El desagüe del inodoro va...</p> <p>1 ...a red pública? (cloaca)</p> <p>2 ...a cámara séptica y pozo ciego?</p> <p>3 ...sólo a pozo ciego?</p> <p>4 ...a hoyo, excavación en tierra?</p>
CHCV14	<p>El baño, ¿es de uso exclusivo de este hogar?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR AL QUE PERTENECE LA PERSONA SELECCIONADA

TAMAÑO DEL HOGAR

CNTDDCOMP

Cantidad de miembros del hogar

CNTDD1665

Cantidad de miembros de 16 a 65 años

TIPO DE HOGAR

TIPO_H

Tipo de hogar

- 1 Hogar unipersonal
- 2 Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos ni otros miembros
- 3 Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos y con otros miembros
- 4 Hogar multipersonal conyugal completo con hijos sin otros miembros
- 5 Hogar multipersonal conyugal completo con hijos y con otros miembros
- 6 Hogar multipersonal conyugal incompleto sin otros miembros
- 7 Hogar multipersonal conyugal incompleto con otros miembros
- 8 Hogar multipersonal no conyugal

INGRESOS DEL HOGAR

RANGOING

Rango del Ingreso total mensual del hogar en pesos

0	Sin ingresos		
1	1	a	200
2	201	a	400
3	401	a	600
4	601	a	700
5	701	a	800
6	801	a	900
7	901	a	1.000
8	1.001	a	1.250
9	1.251	a	1.500
10	1.501	a	1.750
11	1.751	a	2.000
12	2.001	a	3.000
13	3.001	a	4.000
14	4.001	a	5.000
15	5.001	a	7.500
16	7.501	a	10.000
17	10.001	y	más
99	Ns/nc		

INDICADORES DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE HOGAR

NBI_1

NBI 1 - Vivienda inadecuada

- 1 Sí
- 0 No

NBI_2

NBI 2 - Hacinamiento

- 1 Sí
- 0 No

NBI_3

NBI 3 - Hogares sin baño

- 1 Sí
- 0 No

NBI_4

NBI 4 - Educación

- 1 Sí
- 0 No

NBI_TOT

NBI Total

- 0 Ningún indicador de NBI
- 1 Al menos un indicador de NBI
- 2 Al menos dos indicadores de NBI

- 3 Al menos tres indicadores de NBI
- 4 Al menos cuatro indicadores de NBI

CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR

SEXO DEL JEFE/A

BHCH04J

Sexo

- 1 Varón
- 2 Mujer

EDAD DEL JEFE/A

BHCH05J

Edad

(En años cumplidos)

GRUPEDAD_J

Grupo de edad

- 1 0 a 15 años
- 2 16 a 24 años
- 3 25 a 34 años
- 4 35 a 49 años
- 5 50 a 65 años
- 6 66 años y más
- 9 Ns/nc

SITUACIÓN CONYUGAL DEL JEFE/A

BHCH07J

¿Actualmente está...

- 1 ...unido/a?
- 2 ...casado/a?
- 3 ...separado/a?
- 4 ...divorciado/a?
- 5 ...viudo/a?
- 6 ...soltero/a?

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL JEFE/A

NIVINSTR_J

Nivel de instrucción

- 1 Sin instrucción
- 2 Primario incompleto
- 3 Primario completo
- 4 Secundario incompleto
- 5 Secundario completo
- 6 Terciario o universitario incompleto
- 7 Terciario o universitario completo y más
- 8 Educación especial

COBERTURA DE SALUD DEL JEFE/A

COB_SALUD_J

Cobertura de salud

- 1 Sólo plan de salud privado
- 2 Plan de salud privado y otro
- 3 Sólo obra social
- 4 Obra social y otro no privado
- 5 Sólo servicio de emergencia
- 6 Sólo plan o seguro público
- 7 Plan o seguro público y servicio de emergencia
- 8 No está asociado a nada
- 9 Ns/nc

SITUACIÓN LABORAL DEL JEFE/A

(datos de los jefes/as que no fueron seleccionados en el hogar)

CONDACT_J

Condición de actividad

- 1 Ocupado
- 2 Desocupado
- 3 Inactivo

CAT_OCUP_J

Categoría ocupacional

- 1 Patrón o empleador
- 2 Cuenta propia
- 3 Asalariado (excluye servicio doméstico)
- 4 Asalariado (sólo servicio doméstico)
- 5 Trabajador familiar

BHSL12

¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente en todos sus empleos/ocupaciones?

- 1 Menos de 35 horas semanales
- 2 Entre 35 y 45 horas semanales
- 3 Más de 45 horas semanales
- 9 Ns/nc

BHSL13

¿Desearía trabajar más horas?

- 1 Sí
- 2 No

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA SELECCIONADA

RELACIÓN DE PARENTESCO DEL SELECCIONADO CON EL JEFE/A

BHCH03

¿Cuál es la relación de parentesco con el jefe/a del hogar?

- 1 Jefe/a
- 2 Cónyuge/pareja
- 3 Hijo/a hijastro/a
- 4 Padre/madre
- 5 Hermano/a
- 6 Suegro/a
- 7 Yerno/nuera
- 8 Nieto/a
- 9 Otro familiar
- 10 Otro no familiar

SEXO

BHCH04

Sexo

- 1 Varón
- 2 Mujer

EDAD

BHCH05

¿Cuál es su edad en años cumplidos?

(Edad en años cumplidos)

GRUPEDAD

Grupo de edad

- 2 16 a 24 años
- 3 25 a 34 años
- 4 35 a 49 años
- 5 50 a 65 años
- 9 Ns/nc

SITUACIÓN CONYUGAL

BHCH07

¿Actualmente está...

- 1 ...unido/a?
- 2 ...casado/a?
- 3 ...separado/a?
- 4 ...divorciado/a?
- 5 ...viudo/a?
- 6 ...soltero/a?

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

NIVINSTR

Nivel de instrucción

- 1 Sin instrucción
- 2 Primario incompleto
- 3 Primario completo
- 4 Secundario incompleto
- 5 Secundario completo
- 6 Terciario o universitario incompleto
- 7 Terciario o universitario completo y más
- 8 Educación especial

COBERTURA DE SALUD

COB_SALUD

Cobertura de salud

- 1 Sólo plan de salud privado
- 2 Plan de salud privado y otro
- 3 Sólo obra social
- 4 Obra social y otro no privado
- 5 Sólo servicio de emergencia
- 6 Sólo plan o seguro público
- 7 Plan o seguro público y servicio de emergencia
- 8 No está asociado a nada
- 9 Ns/nc

SITUACIÓN LABORAL

CONDACT

Condición de actividad

- 1 Ocupado
- 2 Desocupado
- 3 Inactivo

CAT_OCUP

Categoría ocupacional

- 1 Patrón o empleador
- 2 Cuenta propia
- 3 Asalariado (excluye servicio doméstico)
- 4 Asalariado (sólo servicio doméstico)
- 5 Trabajador familiar sin pago

BISL12

¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente en todos sus empleos/ocupaciones?

- 1 Menos de 35 horas semanales
- 2 Entre 35 y 45 horas semanales
- 3 Más de 45 horas semanales
- 9 Ns/nc

BISL13

¿Desearía trabajar más horas?

- 1 Sí
- 2 No

AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD Y ENTORNO

SALUD GENERAL

BISG01

En general, usted diría que su salud es...

- 1 ...excelente?
- 2 ...muy buena?
- 3 ...buena?
- 4 ...regular?
- 5 ...mala?

BISG02

Durante los últimos 12 meses, ¿ha sufrido algún accidente que le haya impedido realizar sus actividades habituales por uno o más días?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BISG03

Durante los últimos 12 meses, ¿ha sufrido una enfermedad por la que haya debido guardar cama o reposo bajo consejo médico?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BISG04

Y durante los últimos 12 meses, ¿ha visitado a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

ACCESO Y ENTORNO

BIAC01

¿Conoce personas cercanas a usted que en la actualidad consuman alguna sustancia como marihuana, cocaína, éxtasis, etc.?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BIAC02	<p>¿Cuántas personas conoce aproximadamente?</p> <p>1 Una</p> <p>2 Dos o más</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIAC03	<p>¿Alguna vez sintió curiosidad por probar alguna de estas drogas?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>3 Puede ser</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIAC04	<p>¿Alguna vez tuvo la posibilidad de probar algunas de estas drogas?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIAC05	<p>¿Cuántas veces aproximadamente?</p> <p>1 Una</p> <p>2 Dos o más</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIAC06	<p>Si tuviera la ocasión, ¿probaría alguna?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>3 Puede ser</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIAC07_01	<p>¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir tranquilizantes sin indicación médica?</p> <p>1 Me sería fácil</p> <p>2 Me sería difícil</p> <p>3 No podría conseguir</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIAC07_02	<p>¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir estimulantes sin indicación médica?</p> <p>1 Me sería fácil</p> <p>2 Me sería difícil</p> <p>3 No podría conseguir</p> <p>9 Ns/nc</p>

BIAC07_03

¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir marihuana?

- 1 Me sería fácil
- 2 Me sería difícil
- 3 No podría conseguir
- 9 Ns/nc

BIAC07_04

¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir cocaína?

- 1 Me sería fácil
- 2 Me sería difícil
- 3 No podría conseguir
- 9 Ns/nc

BIAC07_05

¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir pasta base

- 1 Me sería fácil
- 2 Me sería difícil
- 3 No podría conseguir
- 9 Ns/nc

BIAC07_06

¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir éxtasis?

- 1 Me sería fácil
- 2 Me sería difícil
- 3 No podría conseguir
- 9 Ns/nc

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

TABACO

BITA01

¿Ha fumado usted cigarrillos alguna vez en la vida?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BITA02

¿Cuándo fue la primera vez que fumó un cigarrillo?

- 1 Durante los últimos 30 días
- 2 Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 Hace más de un año
- 9 Ns/nc

BITA03	<p>¿Qué edad tenía cuando fumó por primera vez? (Edad en años)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BITA04	<p>¿Cuándo fue la última vez que fumó un cigarrillo?</p> <p>1 Durante los últimos 30 días 2 Hace más de un mes, pero menos de un año 3 Hace más de un año 9 Ns/nc</p>
BITA05	<p>¿Cuántos días fumó cigarrillos en los últimos 30 días? (Cantidad de días)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BITA06	<p>Durante los últimos 30 días, en promedio, ¿cuántos cigarrillos fumó por día? (Cantidad de cigarrillos)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BITA07	<p>¿En toda su vida ha fumado por lo menos 100 cigarrillos?</p> <p>1 Sí 2 No 9 Ns/nc</p>
BITA08	<p>En toda su vida ¿por cuántos años ha fumado a diario? (Cantidad de años)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BITA09_01	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que fuma cigarrillos de vez en cuando?</p> <p>1 Ningún riesgo 2 Riesgo leve o moderado 3 Gran riesgo 4 No sé qué riesgo corre</p>
BITA09_02	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que fuma cigarrillos frecuentemente?</p> <p>1 Ningún riesgo 2 Riesgo leve o moderado 3 Gran riesgo 4 No sé qué riesgo corre</p>

PV_TA	Prevalencia de vida de consumo de tabaco
	1 Sí
	2 No
P1A_TA	Prevalencia del último año de consumo de tabaco
	1 Sí
	2 No
P1M_TA	Prevalencia del último mes de consumo de tabaco
	1 Sí
	2 No

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

BIBA01	¿Ha consumido alguna bebida alcohólica, como por ejemplo vino, cerveza, whisky o similares, alguna vez en la vida?
	1 Sí
	2 No
	9 Ns/nc
BIBA02	¿Cuándo fue la primera vez que consumió alguna de estas bebidas alcohólicas?
	1 Durante los últimos 30 días
	2 Hace más de un mes, pero menos de un año
	3 Hace más de un año
	9 Ns/nc
BIBA03	¿Qué edad tenía cuando consumió bebidas alcohólicas por primera vez? (Edad en años)
	99 Ns/nc
BIBA04	¿Cuándo fue la última vez que tomó alguna de estas bebidas alcohólicas?
	1 Durante los últimos 30 días
	2 Hace más de un mes, pero menos de un año
	3 Hace más de un año
	9 Ns/nc
BIBA05	¿Se ha emborrachado alguna vez en los últimos 30 días?
	1 Sí
	2 No
BIBA06	¿Cuántas veces aproximadamente? (Cantidad de veces)
	99 Ns/nc

BIBA07_01	<p>En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tomó cerveza?</p> <p>(Cantidad de días por mes)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BIBA07_02	<p>En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tomó vino?</p> <p>(Cantidad de días por mes)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BIBA07_03	<p>En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tomó bebida fuerte?</p> <p>(Cantidad de días por mes)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BIBA08_01	<p>Entre semana (de lunes a jueves), ¿aproximadamente, qué cantidad consume en un día de cerveza?</p> <p>(Cantidad de tragos)</p> <p>888 No toma</p>
BIBA08_02	<p>Entre semana (de lunes a jueves), ¿aproximadamente, qué cantidad consume en un día de vino?</p> <p>(Cantidad de tragos)</p> <p>888 No toma</p>
BIBA08_03	<p>Entre semana (de lunes a jueves), ¿aproximadamente, qué cantidad consume en un día de bebida fuerte?</p> <p>(Cantidad de tragos)</p> <p>888 No toma</p>
BIBA08_04	<p>¿Toma otras bebidas alcohólicas?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
BIBA09_01	<p>En el fin de semana (viernes, sábado y domingo), ¿aproximadamente, qué cantidad consume en un día de cerveza?</p> <p>(Cantidad de tragos)</p> <p>888 No toma</p>
BIBA09_02	<p>En el fin de semana (viernes, sábado y domingo), ¿aproximadamente, qué cantidad consume en un día de vino?</p> <p>(Cantidad de tragos)</p> <p>888 No toma</p>

BIBA09_03	<p>En el fin de semana (viernes, sábado y domingo), ¿aproximadamente, qué cantidad consume en un día de bebida fuerte? (Cantidad de tragos)</p> <p>888 No toma</p>
BIBA09_04	<p>¿Toma otras bebidas alcohólicas?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
BIBA14_01	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que toma bebidas alcohólicas de vez en cuando?</p> <p>1 Ningún riesgo</p> <p>2 Riesgo leve o moderado</p> <p>3 Gran riesgo</p> <p>4 No sé qué riesgo corre</p>
BIBA14_02	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que toma bebidas alcohólicas frecuentemente?</p> <p>1 Ningún riesgo</p> <p>2 Riesgo leve o moderado</p> <p>3 Gran riesgo</p> <p>4 No sé qué riesgo corre</p>
PV_BA	<p>Prevalencia de vida de consumo de bebidas alcohólicas</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1A_BA	<p>Prevalencia del último año de consumo de bebidas alcohólicas</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1M_BA	<p>Prevalencia del último mes de consumo de bebidas alcohólicas</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
ABU_C	<p>Abuso de cerveza</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
ABU_V	<p>Abuso de vino</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>

ABU_W	Abuso de bebida fuerte
	1 Sí
	2 No
AB_ES	Abuso de bebidas alcohólicas entre semana
	1 Sí
	2 No
AB_FS	Abuso de bebidas alcohólicas en fin de semana
	1 Sí
	2 No
AB_TC	Abuso total combinado de bebidas alcohólicas
	1 Sí
	2 No
CE_EXC_C	Consumo episódico excesivo de cerveza
	1 Sí
	2 No
CE_EXC_V	Consumo episódico excesivo de vino
	1 Sí
	2 No
CE_EXC_W	Consumo episódico excesivo de bebida fuerte
	1 Sí
	2 No
CE_EXC_ES	Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas entre semana
	1 Sí
	2 No
CE_EXC_FS	Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas en fin de semana
	1 Sí
	2 No
CE_EXC_TC	Consumo episódico excesivo de total combinado de bebidas alcohólicas
	1 Sí
	2 No

TRANQUILIZANTES

- BITR01 **¿Alguna vez tomó algún tranquilizante o sedante para calmar los nervios o para poder dormir, como Valium, Lexotani, Alplax o similares?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BITR02 **¿Los tranquilizantes los tomó...**
- 1 ... con indicación médica?
 - 2 ... por su cuenta?
 - 3 ... primero con indicación médica y luego en mayor cantidad o por más tiempo de lo que le habían indicado?
 - 9 Ns/nc
- BITR03 **¿Quién se los recetó?**
- 1 Médico clínico
 - 2 Psiquiatra
 - 3 Otras Especialidades
 - 9 Ns/nc
- BITR04 **¿Cuándo fue la primera vez que probó tranquilizantes sin indicación médica?**
- 1 Durante los últimos 30 días
 - 2 Hace más de un mes, pero menos de un año
 - 3 Hace más de un año
 - 9 Ns/nc
- BITR05 **¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?**
(Edad en años)
- 99 Ns/nc
- BITR06 **¿Cuándo fue la última vez que tomó tranquilizantes sin indicación médica?**
- 1 Durante los últimos 30 días
 - 2 Hace más de un mes, pero menos de un año
 - 3 Hace más de un año
 - 9 Ns/nc
- BITR07 **¿Cómo obtuvo los tranquilizantes que consumió en los últimos 30 días?**
- 1 De un médico
 - 2 De un familiar
 - 3 De un amigo
 - 4 De un farmacéutico
 - 5 Otro
 - 9 Ns/nc

BITR08	<p>¿Con que frecuencia consumió tranquilizantes sin indicación médica en los últimos 30 días?</p> <p>(Días por mes)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BITR09_01	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que consume tranquilizantes sin indicación médica de vez en cuando?</p> <p>1 Ningún riesgo</p> <p>2 Riesgo leve o moderado</p> <p>3 Gran riesgo</p> <p>4 No sé qué riesgo corre</p>
BITR09_02	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que consume tranquilizantes sin indicación médica frecuentemente?</p> <p>1 Ningún riesgo</p> <p>2 Riesgo leve o moderado</p> <p>3 Gran riesgo</p> <p>4 No sé qué riesgo corre</p>
PV_TR	<p>Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1A_TR	<p>Prevalencia del último año de consumo de tranquilizantes</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1M_TR	<p>Prevalencia del último mes de consumo de tranquilizantes</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
ESTIMULANTES	
BIES01	<p>¿Alguna vez tomó algún estimulante como por ejemplo Anfetaminas, Tamlán, Rubifén o Ritalina?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIES02	<p>¿Los estimulantes los tomó...</p> <p>1 ... con indicación médica?</p> <p>2 ... por su cuenta?</p> <p>3 ... primero con indicación médica y luego en mayor cantidad o por más tiempo de lo que le habían indicado?</p> <p>9 Ns/nc</p>

BIES03	<p>¿Quién se los recetó?</p> <p>1 Médico clínico</p> <p>2 Psiquiatra</p> <p>3 Otras Especialidades</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIES04	<p>¿Cuándo fue la primera vez que probó estimulantes sin indicación médica?</p> <p>1 Durante los últimos 30 días</p> <p>2 Hace más de un mes, pero menos de un año</p> <p>3 Hace más de un año</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIES05	<p>¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?</p> <p>(Edad en años)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BIES06	<p>¿Cuándo fue la última vez que tomó estimulantes sin indicación médica?</p> <p>1 Durante los últimos 30 días</p> <p>2 Hace más de un mes, pero menos de un año</p> <p>3 Hace más de un año</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIES07	<p>¿Cómo obtuvo los estimulantes que consumió en los últimos 30 días?</p> <p>1 De un médico</p> <p>2 De un familiar</p> <p>3 De un amigo</p> <p>4 De un farmacéutico</p> <p>5 Otro</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIES08	<p>¿Con que frecuencia consumió estimulantes sin indicación médica en los últimos 30 días?</p> <p>(Días por mes)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BITES9_01	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que consume estimulantes sin indicación médica de vez en cuando?</p> <p>1 Ningún riesgo</p> <p>2 Riesgo leve o moderado</p> <p>3 Gran riesgo</p> <p>4 No sé qué riesgo corre</p>

BIES09_02	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que consume estimulantes sin indicación médica frecuentemente?</p> <p>1 Ningún riesgo</p> <p>2 Riesgo leve o moderado</p> <p>3 Gran riesgo</p> <p>4 No sé qué riesgo corre</p>
PV_ES	<p>Prevalencia de vida de consumo de estimulantes</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1A_ES	<p>Prevalencia del último año de consumo de estimulantes</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1M_ES	<p>Prevalencia del último mes de consumo de estimulantes</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
MARIHUANA	
BIMA01	<p>¿Alguna vez probó marihuana?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIMA02	<p>¿Cuándo fue la primera vez que probó esta sustancia?</p> <p>1 Durante los últimos 30 días</p> <p>2 Hace más de un mes, pero menos de un año</p> <p>3 Hace más de un año</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIMA03	<p>¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez? (Edad en años)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BIMA04	<p>En el período que usted consumía marihuana con mayor frecuencia, ¿cada cuánto consumía?</p> <p>1 Casi todos los días</p> <p>2 3 o 4 días a la semana</p> <p>3 1 o 2 días a la semana</p> <p>4 De 1 a 3 días al mes</p> <p>5 Menos de una vez al mes</p>

- 6 Una sola vez
- 9 Ns/nc

BIMA05

¿Cuándo fue la última vez que consumió esta sustancia?

- 1 Durante los últimos 30 días
- 2 Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 Hace más de un año
- 9 Ns/nc

BIMA06

¿Ha sentido un deseo tan grande de usar marihuana que no pudo resistir o pensar en nada más?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BIMA07

¿Ha consumido marihuana a pesar de que no tenía intención de hacerlo?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BIMA08

¿Ha terminado consumiendo marihuana en mayores cantidades de lo que usted pensó?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BIMA09

¿Alguna vez usó marihuana para eliminar problemas como estos (tarjeta 2) o para evitar que se presentaran?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BIMA10

¿Y ha presentado problemas como éstos (tarjeta 2) cuando suspendía o disminuía el consumo de marihuana?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BIMA11

¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con marihuana, ha consumido mayor cantidad que antes?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

- BIMA12 **¿Ha notado que la misma cantidad de marihuana tiene menos efectos en usted que antes?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BIMA13 **¿Ha dejado de hacer actividades de diversión o que a usted le gustan por el consumo de la marihuana?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BIMA14 **¿Pasa más tiempo que antes para recuperarse del consumo de marihuana?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BIMA15 **¿El uso de marihuana le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BIMA16 **¿Continuó consumiendo aún después de saber que le causaba problemas de salud, emocionales o psicológicos?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BIMA17_01 **En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que consume marihuana de vez en cuando?**
- 1 Ningún riesgo
 - 2 Riesgo leve o moderado
 - 3 Gran riesgo
 - 4 No sé qué riesgo corre
- BIMA17_02 **En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que consume marihuana frecuentemente?**
- 1 Ningún riesgo
 - 2 Riesgo leve o moderado
 - 3 Gran riesgo
 - 4 No sé qué riesgo corre

PV_MA **Prevalencia de vida de consumo de marihuana**
1 Sí
2 No

P1A_MA **Prevalencia del último año de consumo de marihuana**
1 Sí
2 No

P1M_MA **Prevalencia del último mes de consumo de marihuana**
1 Sí
2 No

COCAÍNA

BICO01 **¿Alguna vez probó cocaína?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc

BICO02 **¿Cuándo fue la primera vez que probó esta sustancia?**
1 Durante los últimos 30 días
2 Hace más de un mes, pero menos de un año
3 Hace más de un año
9 Ns/nc

BICO03 **¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?**
(Edad en años)
99 Ns/nc

BICO04 **En el período que usted consumía cocaína con mayor frecuencia
¿cada cuánto consumía?**
1 Casi todos los días
2 3 o 4 días a la semana
3 1 o 2 días a la semana
4 De 1 a 3 días al mes
5 Menos de una vez al mes
6 Una sola vez
9 Ns/nc

BICO05 **¿Cuándo fue la última vez que consumió esta sustancia?**
1 Durante los últimos 30 días
2 Hace más de un mes, pero menos de un año
3 Hace más de un año
9 Ns/nc

- BICO06 **¿Ha sentido un deseo tan grande de usar cocaína que no pudo resistir o pensar en nada más?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc
- BICO07 **¿Ha consumido cocaína a pesar de que no tenía intención de hacerlo?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc
- BICO08 **¿Ha terminado consumiendo cocaína en mayores cantidades de lo que usted pensó?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc
- BICO09 **¿Alguna vez usó cocaína para eliminar problemas como estos (tarjeta 2) o para evitar que se presentaran?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc
- BICO10 **¿Y ha presentado problemas como éstos (tarjeta 2) cuando suspendía o disminuía el consumo de cocaína?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc
- BICO11 **¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con cocaína, ha consumido mayor cantidad que antes?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc
- BICO12 **¿Ha notado que la misma cantidad de cocaína tiene menos efectos en usted que antes?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc

BICO13	<p>¿Ha dejado de hacer actividades de diversión o que a usted le gustan por el consumo de la cocaína?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BICO14	<p>¿Pasa más tiempo que antes para recuperarse del consumo de cocaína?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BICO15	<p>¿El uso de cocaína le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BICO16	<p>¿Continuó consumiendo aún después de saber que le causaba problemas de salud, emocionales o psicológicos?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BICO17_01	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que consume cocaína de vez en cuando?</p> <p>1 Ningún riesgo</p> <p>2 Riesgo leve o moderado</p> <p>3 Gran riesgo</p> <p>4 No sé qué riesgo corre</p>
BICO17_02	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que consume cocaína frecuentemente?</p> <p>1 Ningún riesgo</p> <p>2 Riesgo leve o moderado</p> <p>3 Gran riesgo</p> <p>4 No sé qué riesgo corre</p>
PV_CO	<p>Prevalencia de vida de consumo de cocaína</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1A_CO	<p>Prevalencia del último año de consumo de cocaína</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>

P1M_CO

Prevalencia del último mes de consumo de cocaína

- 1 Sí
- 2 No

PASTA BASE

BIPB01

¿Alguna vez probó pasta base?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BIPB02

¿Cuándo fue la primera vez que probó esta sustancia?

- 1 Durante los últimos 30 días
- 2 Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 Hace más de un año
- 9 Ns/nc

BIPB03

¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

(Edad en años)

- 99 Ns/nc

BIPB04

En el período que usted consumía pasta base con mayor frecuencia ¿cada cuánto consumía?

- 1 Casi todos los días
- 2 3 o 4 días a la semana
- 3 1 o 2 días a la semana
- 4 De 1 a 3 días al mes
- 5 Menos de una vez al mes
- 6 Una sola vez
- 9 Ns/nc

BIPB05

¿Cuándo fue la última vez que consumió esta sustancia?

- 1 Durante los últimos 30 días
- 2 Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 Hace más de un año
- 9 Ns/nc

BIPB06

¿Ha sentido un deseo tan grande de usar pasta base que no pudo resistir o pensar en nada más?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

- BIPB07 **¿Ha consumido pasta base a pesar de que no tenía intención de hacerlo?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc
- BIPB08 **¿Ha terminado consumiendo pasta base en mayores cantidades de lo que usted pensó?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc
- BIPB09 **¿Alguna vez usó pasta base para eliminar problemas como estos (tarjeta 2) o para evitar que se presentaran?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc
- BIPB10 **¿Y ha presentado problemas como éstos (tarjeta 2) cuando suspendía o disminuía el consumo de pasta base?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc
- BIPB11 **¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con pasta base, ha consumido mayor cantidad que antes?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc
- BIPB12 **¿Ha notado que la misma cantidad de pasta base tiene menos efectos en usted que antes?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc
- BIPB13 **¿Ha dejado de hacer actividades de diversión o que a usted le gustan por el consumo de la pasta base?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc

BIPB14	<p>¿Pasa más tiempo que antes para recuperarse del consumo de pasta base?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIPB15	<p>¿El uso de pasta base le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIPB16	<p>¿Continuó consumiendo pasta base aún después de saber que le causaba problemas de salud, emocionales o psicológicos?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIPB17_01	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que consume pasta base de vez en cuando?</p> <p>1 Ningún riesgo</p> <p>2 Riesgo leve o moderado</p> <p>3 Gran riesgo</p> <p>4 No sé qué riesgo corre</p>
BIPB17_02	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que consume pasta base frecuentemente?</p> <p>1 Ningún riesgo</p> <p>2 Riesgo leve o moderado</p> <p>3 Gran riesgo</p> <p>4 No sé qué riesgo corre</p>
PV_PB	<p>Prevalencia de vida de consumo de pasta base</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1A_PB	<p>Prevalencia del último año de consumo de pasta base</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1M_PB	<p>Prevalencia del último mes de consumo de pasta base</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>

ÉXTASIS

BIEX01

¿Alguna vez probó éxtasis?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BIEX02

¿Cuándo fue la primera vez que probó esta sustancia?

- 1 Durante los últimos 30 días
- 2 Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 Hace más de un año
- 9 Ns/nc

BIEX03

¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

(Edad en años)

- 99 Ns/nc

BIEX04

En el período que usted consumía éxtasis con mayor frecuencia ¿cada cuánto consumía?

- 1 Casi todos los días
- 2 3 o 4 días a la semana
- 3 1 o 2 días a la semana
- 4 De 1 a 3 días al mes
- 5 Menos de una vez al mes
- 6 Una sola vez
- 9 Ns/nc

BIEX05

¿Cuándo fue la última vez que consumió esta sustancia?

- 1 Durante los últimos 30 días
- 2 Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 Hace más de un año
- 9 Ns/nc

BIEX06

¿Ha sentido un deseo tan grande de usar éxtasis que no pudo resistir o pensar en nada más?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BIEX07

¿Ha consumido éxtasis a pesar de que no tenía intención de hacerlo?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

- BIEX08 **¿Ha terminado consumiendo éxtasis en mayores cantidades de lo que usted pensó?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BIEX09 **¿Alguna vez usó éxtasis para eliminar problemas como estos (tarjeta 2) o para evitar que se presentaran?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BIEX10 **¿Y ha presentado problemas como éstos (tarjeta 2) cuando suspendía o disminuía el consumo de éxtasis?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BIEX11 **¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con éxtasis, ha consumido mayor cantidad que antes?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BIEX12 **¿Ha notado que la misma cantidad de éxtasis tiene menos efectos en usted que antes?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BIEX13 **¿Ha dejado de hacer actividades de diversión o que a usted le gustan por el consumo de éxtasis?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BIEX14 **¿Pasa más tiempo que antes para recuperarse del consumo de éxtasis?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc

BIEX15	<p>¿El uso de éxtasis le causó algún problema de salud, emocional o psicológico?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIEX16	<p>¿Continuó consumiendo éxtasis aún después de saber que le causaba problemas de salud, emocionales o psicológicos?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIEX17_01	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que consume éxtasis de vez en cuando?</p> <p>1 Ningún riesgo</p> <p>2 Riesgo leve o moderado</p> <p>3 Gran riesgo</p> <p>4 No sé qué riesgo corre</p>
BIEX17_02	<p>En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona que consume éxtasis frecuentemente?</p> <p>1 Ningún riesgo</p> <p>2 Riesgo leve o moderado</p> <p>3 Gran riesgo</p> <p>4 No sé qué riesgo corre</p>
PV_EX	<p>Prevalencia de vida de consumo de éxtasis</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1A_EX	<p>Prevalencia del último año de consumo de éxtasis</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1M_EX	<p>Prevalencia del último mes de consumo de éxtasis</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>

INHALABLES

- BIIN01 **¿Alguna vez probó sustancias como Pegamento, Poxi-rán o similares para inhalar o aspirar?**
- 1 Sí
 - 2 No
 - 9 Ns/nc
- BIIN02 **¿Cuándo fue la primera vez que probó inhalables?**
- 1 Durante los últimos 30 días
 - 2 Hace más de un mes, pero menos de un año
 - 3 Hace más de un año
 - 9 Ns/nc
- BIIN03 **¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?**
(Edad en años)
- 99 Ns/nc
- BIIN04 **En el período que usted consumía inhalables con mayor frecuencia ¿cada cuánto consumía?**
- 1 Casi todos los días
 - 2 3 o 4 días a la semana
 - 3 1 o 2 días a la semana
 - 4 De 1 a 3 días al mes
 - 5 Menos de una vez al mes
 - 6 Una sola vez
 - 9 Ns/nc
- BIIN05 **¿Cuándo fue la última vez que tomó inhalables?**
- 1 Durante los últimos 30 días
 - 2 Hace más de un mes, pero menos de un año
 - 3 Hace más de un año
 - 9 Ns/nc
- PV_IN **Prevalencia de vida de consumo de inhalables**
- 1 Sí
 - 2 No
- P1A_IN **Prevalencia del último año de consumo de inhalables**
- 1 Sí
 - 2 No

P1M_IN

Prevalencia del último mes de consumo de inhalables

- 1 Sí
- 2 No

OTRAS DROGAS

MEDICAMENTOS PARA ADELGAZAR SIN INDICACIÓN MÉDICA

BIODA_01

¿Consumió alguna vez medicamentos para adelgazar sin indicación médica?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BIODA_02

¿Qué edad tenía cuando probó por primera vez medicamentos para adelgazar sin indicación médica?

(Edad en años)

- 99 Ns/nc

BIODA_03

¿Cuándo fue la última vez que consumió medicamentos para adelgazar sin indicación médica?

- 1 En los últimos 30 días
- 2 Hace más de un mes, pero menos de un año
- 3 Hace más de un año
- 9 Ns/nc

PV_ANX

Prevalencia de vida de consumo de medicamentos para adelgazar

- 1 Sí
- 2 No

P1A_ANX

Prevalencia del último año de consumo de medicamentos para adelgazar

- 1 Sí
- 2 No

P1M_IN

Prevalencia del último mes de consumo de medicamentos para adelgazar

- 1 Sí
- 2 No

OPIÁCEOS Y ANESTÉSICOS

BIODB_01

¿Consumió alguna vez opiáceos y anestésicos?

- 1 Sí
- 2 No
- 9 Ns/nc

BIODB_02	<p>¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez opiáceos y anestésicos? (Edad en años)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BIODB_03	<p>¿Cuándo fue la última vez que consumió opiáceos y anestésicos?</p> <p>1 En los últimos 30 días</p> <p>2 Hace más de un mes, pero menos de un año</p> <p>3 Hace más de un año</p> <p>9 Ns/nc</p>
PV_OA	<p>Prevalencia de vida de consumo de opiáceos y anestésicos</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1A_OA	<p>Prevalencia del último año de consumo de opiáceos y anestésicos</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
P1M_OA	<p>Prevalencia del último mes de consumo de opiáceos y anestésicos</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
CRACK	
BIODC_01	<p>¿Consumió alguna vez crack?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p> <p>9 Ns/nc</p>
BIODC_02	<p>¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez crack? (Edad en años)</p> <p>99 Ns/nc</p>
BIODC_03	<p>¿Cuándo fue la última vez que consumió crack?</p> <p>1 En los últimos 30 días</p> <p>2 Hace más de un mes, pero menos de un año</p> <p>3 Hace más de un año</p> <p>9 Ns/nc</p>
PV_CK	<p>Prevalencia de vida de consumo de crack</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>

P1A_CK **Prevalencia del último año de consumo de crack**
1 Sí
2 No

P1M_CK **Prevalencia del último mes de consumo de crack**
1 Sí
2 No

ALUCINÓGENOS

BIODD_01 **¿Consumió alguna vez alucinógenos?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc

BIODD_02 **¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez alucinógenos?**
(Edad en años)
99 Ns/nc

BIODD_03 **¿Cuándo fue la última vez que consumió alucinógenos?**
1 En los últimos 30 días
2 Hace más de un mes, pero menos de un año
3 Hace más de un año
9 Ns/nc

PV_AL **Prevalencia de vida de consumo de alucinógenos**
1 Sí
2 No

P1A_AL **Prevalencia del último año de consumo de alucinógenos**
1 Sí
2 No

P1M_AL **Prevalencia del último mes de consumo de alucinógenos**
1 Sí
2 No

OTRAS DROGAS

BIODE_01 **¿Consumió alguna vez otras drogas?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc

BIODE_02 **¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez otras drogas?**
(Edad en años)
99 Ns/nc

BIODE_03 **¿Cuándo fue la última vez que consumió otras drogas?**
1 En los últimos 30 días
2 Hace más de un mes, pero menos de un año
3 Hace más de un año
9 Ns/nc

IMPACTO DEL CONSUMO EN LAS ACTIVIDADES HABITUALES

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

BIBA10 **¿Cuántos días completos ha faltado o suspendido sus actividades habituales (trabajo, estudio, etc.)?**
(Cantidad de días)
999 Ns/nc
0 Ningún día

BIBA11 **En los últimos 12 meses, ¿cuántos días completos ha faltado o suspendido sus actividades habituales por enfermedad u otra razón que pueda haberse debido al uso de alcohol?**
(Cantidad de días)
999 Ns/nc

BIBA12 **¿Ha tenido algún accidente laboral que pudo estar relacionado con el uso de alcohol?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc

BIBA13 **¿Ha tenido algún accidente de tránsito que pudo estar relacionado con el uso de alcohol?**
1 Sí
2 No
9 Ns/nc

DROGAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

BIIM01 **En los últimos 12 meses, ¿cuántos días completos ha faltado al trabajo o ha suspendido sus actividades habituales por enfermedad u otra razón que pueda haberse debido al uso de drogas?**
(Cantidad de días)

888 No consumió

999 Ns/nc

BIIM02

En los últimos 12 meses, ¿cuántos días completos ha faltado al trabajo o ha suspendido sus actividades habituales por enfermedad u otra razón que pueda haberse debido al uso conjunto de alcohol y droga?

(Cantidad de días)

888 No consumió

999 Ns/nc

BIIM03

¿Ha tenido algún accidente laboral que pudo estar relacionado con el uso de drogas?

1 Sí

2 No

9 Ns/nc

BIIM04

¿Ha tenido algún accidente de tránsito que pudo estar relacionado con el uso de drogas?

1 Sí

2 No

9 Ns/nc

DEMANDA DE TRATAMIENTO DEL SELECCIONADO

BIDT01

¿Alguna vez buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas?

1 Sí

2 No

9 Ns/nc

BIDT02_01

¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Alcohólicos Anónimos?

1 Sí

2 No

BIDT02_02

¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Narcóticos Anónimos?

1 Sí

2 No

- BIDT02_03 **¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Grupos de autoayuda para problemas de tabaquismo?**
- 1 Sí
2 No
- BIDT02_04 **¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Comunidades terapéuticas?**
- 1 Sí
2 No
- BIDT02_05 **¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Centros de alcoholismo?**
- 1 Sí
2 No
- BIDT02_06 **¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Consultorios externos?**
- 1 Sí
2 No
- BIDT02_07 **¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Clínicas psiquiátricas?**
- 1 Sí
2 No
- BIDT02_08 **¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Centros de desintoxicación?**
- 1 Sí
2 No
- BIDT02_09 **¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Hospitales Generales?**
- 1 Sí
2 No
- BIDT02_10 **¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Centros de Salud Mental?**
- 1 Sí
2 No

BIDT02_11	<p>¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Servicios gratuitos de líneas telefónicas?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
BIDT02_12	<p>¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Iglesias o grupos religiosos?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
BIDT02_13	<p>¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en otro lugar?</p> <p>1 Sí</p> <p>2 No</p>
BIDT03	<p>¿Está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias?</p> <p>1 Sí, está actualmente</p> <p>2 Sí, estuvo alguna vez</p> <p>3 Nunca estuvo</p>

ANEXO 1: Aspectos metodológicos

1- Diseño muestral

El diseño muestral de la ENPreCoSP-2008 es probabilístico multietápico, contemplando la selección de personas a través de cuatro etapas. Las dos primeras corresponden al Marco de Muestreo Nacional Urbano¹ (MMNU), el cual responde a un listado exhaustivo de las viviendas de sólo una parte del universo, mediante el muestreo preliminar de áreas.

El universo del MMNU comprende viviendas particulares del país ubicadas en aglomeraciones que, según Censo 91, tenían al menos 5.000 habitantes. El plan de muestreo del mismo consta de dos etapas:

1ra etapa: el muestreo de unidades primarias: aglomeraciones.

2da etapa: el muestreo de unidades secundarias: radios censales o conjuntos de radios censales contiguos.

Se entiende por aglomeración a una localidad o conjunto de localidades que por continuidad de edificaciones y calles configuran una misma unidad urbana. Los radios censales son unidades menores definidas para la asignación de las cargas de trabajo de los censistas; generalmente están conformadas por un conjunto de manzanas o sectores de alrededor de 300 viviendas.

Los procedimientos de selección aplicados fueron los de muestreo probabilístico de áreas y estratificado (criterios de estratificación: tamaño de la aglomeración en función de viviendas, jurisdicción del país de pertenencia y ubicación geográfica, datos de actividad económica y tasa de crecimiento intercensal); las probabilidades de selección asignadas a las unidades de muestreo, en cada etapa, fueron proporcionales a las cantidades de viviendas particulares, ocupadas o en construcción, registradas en el Censo 91.

El total de unidades primarias que componen el MMNU es de 114 aglomeraciones, de un total de 420 en el universo muestreado. En el total de unidades primarias seleccionadas, hay 44 que han sido incorporadas de facto. Este grupo incluye las ciudades de 100.000 o más habitantes, así como las aglomeraciones de tamaño intermedio de algunas regiones con menor concentración de población.

La cantidad mínima de unidades secundarias seleccionadas, dentro de cada unidad primaria, fue de 12. En las localidades de menor tamaño, que contenían 12 o menos radios censales, éstos fueron incluidos en su totalidad.

¹Marco de Muestreo Nacional Urbano para Encuestas a Hogares. Publicación 12 Metodología. INDEC (1999)

Finalmente, para la elaboración del MMNU se procedió a identificar y registrar adecuadamente todas las viviendas particulares existentes dentro de cada una de las unidades secundarias. Esta tarea se realizó listando en terreno las viviendas de cada área.

Para la ENPreCoSP-2008, se seleccionaron de cada área incluida en el MMNU, una muestra de viviendas en forma sistemática, introduciendo la tercera etapa de selección. Dentro de cada una de estas viviendas, se relevaron todos los hogares encontrados en las mismas, y dentro de cada hogar, se seleccionó al azar un individuo de 16 a 65 años para responder al cuestionario específico de consumo de sustancias psicoactivas, siendo ésta la cuarta y última etapa de muestreo.

A partir del diseño muestral se desprende que, la unidad estadística es la vivienda, la unidad de relevamiento el hogar, y la unidad de análisis el individuo.

Población Objetivo y Dominios de estimación

La población objetivo para esta encuesta comprende las personas con edades entre 16 y 65 años que habitan en viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas de 5.000 y más habitantes de la República Argentina.

La encuesta permite considerar los siguientes dominios de estimación:

- total del país

- 6 regiones estadísticas:
 - GBA
 - Pampeana
 - NOA
 - NEA
 - Cuyo
 - Patagonia

- 4 agrupamientos de poblaciones urbanas:
 - más de 1.500.000 habitantes
 - de 500.001 a 1.500.000 habitantes
 - de 100.001 a 500.000 habitantes
 - de 5.000 a 100.000 habitantes

- División política:
 - 23 provincias
 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- 7 aglomerados urbanos de 500.000 y más habitantes:
 - Gran Buenos Aires
 - Gran Córdoba
 - Gran Rosario
 - Gran Mendoza
 - Gran Tucumán-Tafí Viejo
 - Gran La Plata
 - Mar del Plata-Batán

2- Análisis de la muestra

Características de la muestra

A partir de estudios previos y sobre la base de estimaciones de prevalencias para diversas sustancias, el tamaño muestral para cada jurisdicción del país resultó ser alrededor de 2.000 personas.

Considerando que el diseño de la ENPreCoSP-2008 prevé seleccionar un individuo por hogar, el tamaño muestral final, por jurisdicción del país, fue de alrededor de las 2.000 viviendas. Esto implica que para el total país se llegó a una muestra de 51.162 viviendas

En cada vivienda se encuesta a todos los hogares que la habitan, considerándose que un hogar lo conforman aquellas personas, parientes o no, que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación y/u otros gastos esenciales para vivir.

Cada vivienda seleccionada en la muestra puede ser encuestable o no encuestable. Se considera encuestable a aquella vivienda en la cual existe al menos un hogar, y no encuestable, a aquella en la cual no habita ningún hogar en forma permanente al momento de la entrevista, por ejemplo, vivienda deshabitada, usada como establecimiento o negocio, en construcción, etc.

Resultaron encuestables 45.772 viviendas, representando el 89,5% del total de viviendas seleccionadas. A partir de este conjunto se obtuvo respuesta en 38.954 viviendas, por lo tanto el rendimiento efectivo de la muestra, medido en viviendas, fue de 85,1%.

En esas viviendas se encontraron 40.360 hogares, es decir que en el 3,5% de las viviendas hay hogares que la comparten.

Para responder el cuestionario individual, se seleccionó en cada hogar, de manera aleatoria, una persona de 16 a 65 años. Se obtuvo respuesta en 34.203 hogares correspondientes a 33.146 viviendas. De esta manera, del total de viviendas encuestables de la muestra de origen, 45.772 se logró información para la unidad de análisis, en un 72,4%, que llamamos rendimiento específico de la muestra de viviendas.

No respuesta de los hogares

Del conjunto de viviendas encuestables, 45.772 se obtuvo respuesta, como se vio anteriormente, en el 85,1%. En el 14,9 % restante no se logró concretar la entrevista por diversas razones, rechazo, ausencia de sus moradores, u otras causas (discapacidad, idioma extranjero, etc.).

En el siguiente cuadro se muestra la distribución por jurisdicción del país de esta no respuesta efectiva, ordenada en forma decreciente:

Jurisdicción del país	% NR efectiva
Total país	14,9
Buenos Aires	24,6
La Pampa	24,2
Chubut	24,0
Corrientes	21,4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	21,1
Córdoba	19,2
Santa Fe	17,7
Neuquén	17,5
Santa Cruz	15,7
Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur	14,5

Santiago del Estero	14,3
La Rioja	14,0
Río Negro	13,5
Entre Ríos	12,5
San Luis	11,6
Mendoza	10,0
Formosa	9,9
Chaco	9,5
Tucumán	9,4
Salta	8,2
San Juan	8,2
Jujuy	7,8
Misiones	7,3
Catamarca	6,4

No respuesta individual

Representa aquellos casos en los que, habiendo accedido al hogar, el individuo seleccionado no responde a la entrevista del Bloque Individual.

En el total país hubo 1.503 casos. Los motivos por los cuales no se obtuvo respuesta fueron ausencia, rechazo y otras causas de la persona seleccionada.

En el cuadro siguiente se presentan los porcentajes, por jurisdicción del país, de no respuesta individual con respecto al total de hogares respuesta, ordenadas de mayor a menor:

Jurisdicción del país	% de NR individual
Total país	3,7
Buenos Aires	5,9
Tucumán	5,5
La Pampa	5,4
Corrientes	5,4
Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur	5,3
Salta	5,1
Neuquén	5,0
Santiago del Estero	4,9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4,7
Santa Fe	4,5
Córdoba	4,4
La Rioja	4,0
San Luis	3,6
Mendoza	3,3
Jujuy	2,7
Chaco	2,4

Formosa	2,3
Santa Cruz	2,3
Catamarca	2,1
Chubut	1,9
Entre Ríos	1,9
Misiones	1,9
San Juan	1,8
Río Negro	1,8

3- Expansión de la muestra y calibración de los factores de expansión

Una etapa crítica en toda encuesta con un diseño muestral complejo como es el de la ENPreCoSP-2008 es la expansión de la información relevada para la muestra al universo de referencia o población objetivo. Una selección adecuada y el posterior desarrollo de una metodología para ponderar los datos muestrales es importante ya que debe atender simultáneamente varios requerimientos.

Las distintas temáticas estudiadas y la necesidad de lograr estimaciones para cada una de ellas a distintos niveles de desagregación obliga a que dicha metodología sea la más eficiente posible en términos de precisión, cuidando no privilegiar a algunas en perjuicio de otras. Su implementación tiene que ser simple y única a causa del gran volumen de datos involucrados. Por otro lado, debe ser flexible para facilitar el uso de los datos por distintos investigadores y económica en los tiempos de ejecución y cálculo. Por último, deberá atenuar posibles sesgos por no-respuesta, imputación y otros errores muestrales siempre presentes en investigaciones de esta magnitud.

Cálculo de los pesos iniciales para la ENPreCoSP-2008

Los valores muestrales se expandieron aplicando los factores de expansión correspondientes a cada etapa de selección: aglomerado, área en cada aglomerado y vivienda dentro de cada área

Finalmente se corrigió la no respuesta dentro de cada estrato, considerando que aquellas viviendas que no respondieron tienen el mismo comportamiento que las del estrato al cual pertenecen.

El factor de corrección por no respuesta fue definido como el cociente entre las viviendas que responden, más las que no responden teniendo al menos un hogar, dividido por las viviendas respuestas.

Calibración de los factores de expansión

Entre los problemas más comunes en las encuestas complejas de gran envergadura, que utilizan diseños multietápicos, con conglomerados, distintos niveles de estratificación, con selección de unidades controlada, o con probabilidades de selección proporcionales al tamaño, etc, es la introducción de sesgos en la etapa de estimación. A estos se le agregan los originados por desactualización del marco muestral empleado para la selección, el no relevamiento total o parcial de algunas unidades de muestreo, errores que se introducen en la etapa de la recolección de datos, ingreso o codificación, y la imputación de valores faltantes en ciertas variables de interés.

Todas estas dificultades y dependiendo de la magnitud de los errores llevan a que los sesgos puedan ser pronunciados, impidiendo una interpretación correcta de las estimaciones o imposibilitando la comparación de los resultados con fuentes alternativas.

Como consecuencia de ellos en la práctica es habitual corregir o calibrar los pesos o factores de expansión iniciales (las inversas de las probabilidades de inclusión) con ayuda de información auxiliar conocida o preestablecida a partir de registros o fuentes externas.

Naturalmente la corrección se debe valer de argumentos estadísticos sólidos que determinen pesos óptimos en algún sentido. Es decir, es importante que en las estimaciones no se introduzcan sesgos a causa de la metodología a emplear (con una magnitud tal que lleven a producir importantes crecimientos en el Error Cuadrático Medio del estimador, la habitual medida de precisión en estas circunstancias).

Para la ENPreCoSP-2008 se optó por llevar a cabo un ajuste a los pesos iniciales a través de la técnica de “calibración por marginales fijos” siguiendo la metodología desarrollada por Deville y Särndal [1992].

Ésta, en su forma más general introduce nuevos pesos que resultan de modificar o calibrar las ponderaciones iniciales fijadas en la etapa de diseño al resolver un problema de minimización numérica. Dicho problema queda planteado con la elección de una distancia, entre los nuevos ponderadores y los originales, y la utilización de un conjunto de restricciones impuestas sobre las variables auxiliares que intervienen en el ajuste.

Desde el punto de vista de las estimaciones, el hecho de contar con una estrategia de ajuste o calibración a través del empleo de información auxiliar, definen estimadores que en general llevan a ganar precisión en los resultados finales. Ésta ganancia se acentúa cuando la correlación entre las variables de estudio y las auxiliares empleadas para el ajuste son importantes.

Para la ENPreCoSP-2008 se empleó una distancia que tiene la virtud de controlar la generación de pesos extremos, y al mismo tiempo generar pesos positivos, ya que existen situaciones donde la calibración genera pesos negativos.

Con respecto a la información auxiliar empleada para la calibración, se recurrió a proyecciones de población calculadas por el INDEC para el período de referencia de la Encuesta, a las cuales se les aplicó la estructura interna de la muestra para las variables Sexo (varón-mujer) y para Grupo de Edad (de 16 a 24, 25 a 34, 35 a 49 y 50 a 65 años).

Para salvar posibles inconsistencias en los cuadros a publicar, los pesos calibrados fueron tratados por un algoritmo de redondeo para eliminar la componente decimal con los que salen del proceso iterativo, sin destruir las concordancias alcanzadas.

Es oportuno aclarar que la calibración se efectuó en forma independiente para las viviendas de cada dominio de estimación.

4- Control de estructuras de población

Con el fin de evaluar la muestra obtenida, se comparó la estructura de edad de población expandida sin calibrar de la ENPreCoSP-2008 con las estructuras de edad expandidas y calibradas de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) realizada en el año 2005.

Se eligieron estas comparaciones ya que la ENFR posee la misma cobertura geográfica que la ENPreCoSP-2008 y, si bien la EPH no cuenta con la misma cobertura geográfica, ésta es la principal encuesta del país y se realiza en forma continua con lo cual se tiene una comparación con datos más cercanos en el tiempo.

La comparación no arrojó diferencias por lo que se deduce que la muestra es representativa de la población, y al momento de la calibración ésta se realizó con respecto a la estructura por edad y sexo de la propia encuesta.

Bibliografía

Deville, J. y Särndal, C.E. (1992). Calibration Estimators in Survey Sampling. *JASA*, 87, 376-382.

Deville, J., Särndal, C.E., Sautory O. (1993). Generalized Raking Procedures in Survey Sampling. *JASA*, 88, 1013-1020.

Särndal, C.E, Swesson, B y Wretman, J.H (1992). *Model Assisted Survey Sampling*. New York: Spriger-Verlag.

SAS/STAT User's Guide Release 8.2 Edition. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA

Sautory, O. (1993). La Macro CALMAR: Redressement d'un Echantillon par Calage sur Marges, Document de travail de la Direction des Statistiques Demographiques et Sociales, No F9310.

ANEXO 2: Aspectos conceptuales

Definiciones de variables construidas

En este anexo se presentan definiciones básicas de las variables construidas a partir de una o varias preguntas del cuestionario.

La construcción de estas variables obedeció a diferentes objetivos. En algunos casos, como la variable “Grupo de edad”, sirvió para reagrupar las modalidades de respuesta para facilitar el análisis. En otros casos, como “Nivel de instrucción”, permitió obtener una variable resumen a partir de un conjunto de dos o más preguntas. Finalmente, existen otras variables, como la de “Dependencia de marihuana”, en las que se construyó un indicador completo utilizado internacionalmente a partir de un conjunto de preguntas del cuestionario.

Estas variables son: tipo de hogar, rango de ingreso, necesidades básicas insatisfechas, grupo de edad, nivel de instrucción, cobertura de salud, condición de actividad, categoría ocupacional, prevalencia de vida, prevalencia del último año, prevalencia del último mes, consumo episódico de bebidas alcohólicas, abuso de bebidas alcohólicas y dependencia.

Tipo de Hogar

La variable “Tipo de hogar” fue construida a partir de las diferentes combinaciones de respuesta a la pregunta 3 del capítulo 5 del Bloque del Hogar (“¿Cuál es la relación de parentesco con el jefe/a?”), y permite categorizar a los hogares según su composición.

Se denomina hogar conyugal al hogar integrado por un núcleo conyugal primario con o sin la presencia de otros miembros.

Núcleo conyugal es una familia exclusivamente formada en alguna de las siguientes formas: a) Una pareja sola, es decir sin hijos, b) una pareja con hijos, c) un progenitor (padre o madre) con hijos.

Se denomina hogar no conyugal a aquél que no está constituido por un núcleo conyugal primario. Puede estar constituido por a) sólo parientes no nucleares, b) sólo no parientes o c) parientes no nucleares y no parientes.

Se presentan a continuación los diferentes tipos de hogar y sus definiciones:

1. Hogar unipersonal: en el hogar hay sólo un jefe y ningún otro miembro.
2. Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos ni otros miembros: en el hogar hay un jefe y su cónyuge y no hay hijos ni otros miembros (parientes o no parientes).
3. Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos y con otros miembros: en el hogar hay un jefe y su cónyuge, no hay hijos y hay otros miembros (parientes o no parientes).
4. Hogar multipersonal conyugal completo con hijos sin otros miembros: en el hogar hay un jefe, su cónyuge y hay al menos un hijo. No hay otros miembros (parientes o no parientes).
5. Hogar multipersonal conyugal completo con hijos y con otros miembros: en el hogar hay un jefe, su cónyuge, hay al menos un hijo y hay otros miembros.
6. Hogar multipersonal conyugal incompleto sin otros miembros: en el hogar hay un jefe y al menos un hijo, sin la presencia del cónyuge ni de otros miembros (parientes o no parientes).
7. Hogar multipersonal conyugal incompleto con otros miembros: en el hogar hay un jefe y al menos un hijo, sin la presencia del cónyuge. Hay otros miembros (parientes o no parientes).
8. Hogar multipersonal no conyugal: en el hogar hay un jefe, no hay cónyuge, no hay hijos, y hay al menos un miembro pariente o no pariente.

Rango de ingreso

La variable “Rango de ingreso” se construyó a partir de las respuestas a las preguntas del capítulo 8 del Bloque del Hogar. El monto declarado en la pregunta 1 se llevó a los rangos de ingreso de la pregunta 2, unificándose así las respuestas declaradas en la pregunta 1 y 2 en los siguientes tramos de ingreso:

0. Sin ingresos
1. 1 a 200
2. 201 a 400
3. 401 a 600
4. 601 a 700
5. 701 a 800
6. 801 a 900
7. 901 a 1.000
8. 1.001 a 1250
9. 1.251 a 1.500
10. 1.501 a 1.750
11. 1.751 a 2.000
12. 2.001 a 3.000
13. 3.001 a 4.000
14. 4.001 a 5.000
15. 5.001 a 7.500
16. 7.501 a 10.000
17. 10.001 y más
99. Ns/nc

Necesidades Básicas Insatisfechas

Los hogares con necesidades básicas insatisfechas son aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones de privación:

- Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto.
- Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho).
- Condiciones sanitarias: hogares que no tienen retrete.
- Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela.
- Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria.

En esta encuesta se presentan cuatro de los cinco indicadores de NBI. El indicador de capacidad de subsistencia no fue construido, ya que para ello es necesario contar con la condición de actividad de todos los miembros del hogar, información no captada en esta encuesta.

Se presenta también, a modo de indicador resumen, el NBI total, que da cuenta de la cantidad de indicadores de NBI que tiene cada hogar.

Grupo de edad

La variable “Grupo de edad” se construyó mediante el reagrupamiento de las edades simples (pregunta 5 del capítulo componentes del hogar). Estos rangos permiten categorizar a todos los componentes del hogar en tanto adolescentes o jóvenes, adultos menores, adultos, adultos mayores y mayores.

Los grupos de edad presentados son:

1. 0 a 15 años
2. 16 a 24 años
3. 25 a 34 años
4. 35 a 49 años
5. 50 a 65 años
6. 66 años y más

Nivel de instrucción

La variable “Nivel de instrucción” fue construida con las variables 8, 9, 10 y 11 del capítulo 5 del Bloque del Hogar y permite categorizar el nivel de instrucción de cada uno de los componentes del hogar.

Durante la década de los 90 se estableció una nueva ley educativa (la Ley Federal de Educación), implementada de manera parcial en el ámbito nacional, de manera que, actualmente, conviven ambos sistemas. Para homologar a la población que asiste/asistió a la escuela formal bajo una y otra estructura, se utilizó el siguiente procedimiento: la población que declaró que asiste/asistió a niveles educativos y/o grados o años pertenecientes a la nueva estructura educativa ha sido asignada al año equivalente de la estructura anterior a la Ley Federal de Educación. En este sentido, 1°, 2° y 3° grados del nivel primario equivalen al ciclo EGB1; 4°, 5° y 6° grados del nivel primario equivalen a EGB2; 7° grado del nivel primario equivale al primer año de EGB3 y los dos siguientes de este nivel, a 1° y 2° años del secundario. Por último, 3°, 4° y 5° años del nivel secundario equivalen al nivel polimodal.

Adicionalmente se consideran otras cuatro categorías: una para aquellos que no han ingresado nunca al sistema educativo formal o que alcanzaron el nivel de jardín o preescolar (sin instrucción), otra para aquellos que están en un régimen especial (educación especial) y dos categorías para aquellos que asisten/asistieron a instituciones terciarias o universitarias según hayan finalizado o no esos niveles (terciario o universitario completo y terciario o universitario incompleto).

En resumen, los niveles de instrucción presentados son los siguientes:

1. Sin instrucción
2. Primario incompleto
3. Primario completo
4. Secundario incompleto
5. Secundario completo
6. Terciario o universitario incompleto
7. Terciario o universitario completo
8. Educación especial

Cobertura de salud

La variable “Cobertura de salud” fue construida a partir de las combinaciones posibles de respuesta de los miembros de cada hogar a la pregunta 12 del capítulo 5 del Bloque del Hogar, que es una pregunta con respuesta múltiple.

Las combinaciones de respuesta fueron reagrupadas, conformando las siguientes categorías:

1. Sólo plan de salud privado
2. Plan de salud privado y otro
3. Sólo obra social
4. Obra social y otro no privado
5. Sólo servicio de emergencia
6. Sólo plan o seguro público
7. Plan o seguro público y servicio de emergencia
8. No está asociado a nada
9. Ns/nc

Condición de actividad

La “Condición de actividad²” fue calculada tanto para el jefe del hogar como para el seleccionado, con las preguntas 1 a 7 de los capítulos Situación Laboral.

Las categorías de esta variable son:

1. Ocupados: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). El criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que realiza la población.
2. Desocupados: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Corresponde a desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc.
3. Inactivos: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede subdividirse en inactivos marginales e inactivos típicos según estén dispuestos o no a trabajar.

Categoría ocupacional

La “Categoría ocupacional” fue calculada tanto para el jefe del hogar como para el seleccionado, con las preguntas 8 y 9 de los capítulos Situación Laboral.

Las categorías de esta variable son:

1. Patrón o empleador: trabaja para su propio negocio/empresa/actividad y emplea al menos una persona asalariada.
2. Cuenta propia: trabaja para su propio negocio/empresa/actividad y no emplea ninguna persona asalariada.
3. Asalariado (excluye servicio doméstico): trabaja como obrero o empleado para un patrón/empresa/institución (incluye agencia de empleo).
4. Asalariado (sólo servicio doméstico): trabaja como servicio doméstico.
5. Trabajador familiar sin pago: trabaja como trabajador familiar sin pago.
9. Ns/nc

²Definiciones extraídas de Mercado de trabajo: principales indicadores. Resultados trimestrales y semestrales, Encuesta Permanente de Hogares, 13.03.06

Consumo de sustancias psicoactivas

Para todas las sustancias relevadas, se construyeron los siguientes indicadores:

- Prevalencia de vida: proporción de personas que consumieron la sustancia alguna vez en la vida sobre el total de las personas estudiadas.
- Prevalencia del último año: proporción de personas que consumieron la sustancia en los últimos 12 meses sobre el total de las personas estudiadas.
- Prevalencia del último mes: proporción de personas que consumieron la sustancia en los últimos 30 días sobre el total de las personas estudiadas.

Se construyeron los siguientes indicadores de consumo de bebidas alcohólicas:

- Consumo episódico excesivo de cerveza
- Consumo episódico excesivo de vino
- Consumo episódico excesivo de bebidas fuertes
- Consumo episódico excesivo entre semana
- Consumo episódico excesivo en fin de semana
- Consumo episódico excesivo total y combinado
- Abuso de cerveza
- Abuso de vino
- Abuso de bebidas fuertes
- Abuso entre semana
- Abuso en fin de semana
- Abuso total y combinado de bebidas alcohólicas

Los indicadores de **consumo episódico excesivo** fueron contruidos de acuerdo con los criterios sugeridos por el CDC³ la OPS y otros, y su elaboración se detalla más adelante.

Los indicadores de **abuso** fueron contruidos con el mismo criterio utilizado en el Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004 (ENCoSP-2004) a los efectos de comparar resultados respecto del abuso de bebidas alcohólicas.

Ambos indicadores apuntan a caracterizar el consumo excesivo de alcohol y están definidos por diferentes cantidades de tragos de bebida alcohólica; el consumo excesivo está definido por el consumo de una cantidad de tragos única (cinco), mientras que el abuso considera pesos diferenciales según el tipo de bebida: 8 tragos para cerveza, 5 tragos para vino y 3 tragos para bebida fuerte.

- Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas: resulta de que el encuestado haya consumido 5 o más tragos al menos una vez en los últimos 30 días de los respectivos tipos de bebidas entre semana (pregunta 8 del capítulo Bebidas Alcohólicas) o en el fin de semana (pregunta 9 del capítulo Bebidas Alcohólicas).
- Abuso de bebidas alcohólicas: si se ha registrado abuso entre semana o abuso en fin de semana, se considera que existe abuso total y combinado de bebidas alcohólicas.

Se presentan cada uno de los indicadores considerando el tipo de bebida, el período de la semana (entre semana o fin de semana) y finalmente un indicador resumen (total combinado).

Se calculó también la dependencia con respecto a cuatro sustancias: marihuana, cocaína, pasta base y éxtasis, siguiendo los lineamientos de la CIE-10⁴.

Se define a la dependencia como un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o ma-

³ Centers for Disease Control and Prevention. Indicators for chronic disease surveillance. MMWR 2004.

⁴ Clasificación Estadística Internacional de Enfermedad y otros Problemas de Salud, Décima versión, Organización Mundial de la Salud.

lestar clínicamente significativos, expresado por tres (o más) de los ítems siguientes en algún momento de un período continuado de 12 meses:

- 1.** Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
 - a. una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado;
 - b. el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo continuado.
- 2.** Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
 - a. el síndrome de abstinencia característico para la sustancia (criterios de diagnósticos para la abstinencia de sustancias específicas: presencia de un síndrome específico de una sustancia debido al cese o reducción de su consumo prolongado y en grandes cantidades y un malestar clínicamente significativo o un deterioro de la actividad laboral y social o en otras áreas importantes de la actividad del individuo);
 - b. se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia.
- 3.** La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un período más largo de lo que inicialmente se pretendía.
- 4.** Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la sustancia.
- 5.** Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia (p. ej., visitar a varios médicos o desplazarse largas distancias), en el consumo de la sustancia (p. ej., fumar un pitillo tras otro) o en la recuperación de los efectos de la sustancia.
- 6.** Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la sustancia.
- 7.** Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia (p. ej., consumo de la cocaína a pesar de saber que provoca depresión, o continuada ingesta de alcohol a pesar de que empeora una úlcera).